



VACCINATION DES AGENTS-ES DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG

Quel est le vaccin utilisé ?

Le Centre de vaccinations de la Bourse et la Médecine du travail disposent du vaccin **PFIZER/ BioNTech**.
Ce vaccin utilise la technique de l'ARN messenger.

Posologie

Le vaccin nécessite 2 injections en intra musculaire dans le haut du bras.
La 2^e injection se fera entre 21 et 42 jours après la première injection.

Efficacité

Les essais cliniques ont montré que le vaccin assure une protection de 95 % contre la COVID-19.

Effets secondaires

Le vaccin peut provoquer chez certains des effets indésirables :

- fièvre, douleurs musculaires, maux de tête,
- réaction au point d'injection
- rare réaction allergique de type anaphylactique, d'où une surveillance systématique de 15 minutes en salle d'attente après l'injection.

Contre-indications à la vaccination

- Antécédents d'allergie grave de type anaphylaxie
- Grossesse en cours
- Épisode infectieux en cours, notamment :
 - une infection par la COVID19 avec des symptômes et datant de moins de 3 mois
 - être cas contact en cours de réalisation du test PCR

Questions non encore résolues

- L'efficacité de la vaccination sur la transmission n'étant à ce jour pas connue, **elle ne permet pas pour l'instant de s'affranchir des gestes barrières.**
- La durée de l'immunité vaccinale, faudra t- il prévoir des schémas de revaccination ?
- Le niveau d'efficacité et de tolérance de la vaccination chez les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, les personnes les plus âgées ?